



Riktlinjer för ordination enligt Generella direktiv för vuxna i hemsjukvården 2020

Verksamhet Datum Verksamhetschef (eller läkare med medicinskt ledningsansvar)

*Intygskliniken Kyrshavsked
2020-06-05 Fredrik Sjögren*

HSLF:FS 2017:37 ger möjlighet för läkare från regionens hälso- och sjukvård att upprätta skriftliga generella behandlingsanvisningar, så kallade generella direktiv till sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården. Dessa direktiv är riktade mot olika akuta sjukdomstillstånd. Direktiven skall omprövas regelbundet. Läkemedlen får ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. Given dos skall registreras i journalhandling.

Indikation	Läkemedel	Dosering	Antal tillfällen utan läkarkontakt	Anmärkningar
Kraftig allergisk reaktion	Desloratadin 5 mg	2 tabletter som engångsdos	En gång	Läkare kontaktas vid behov av fortsatt behandling
Akut allergisk reaktion (anafylaxi)	Emerade inj 0,3 mg/dos	En dos à 0,3 mg intramuskulärt	En gång	Läkare måste omedelbart kontaktas! 2 st injektionspennor ska finnas i förrådet
Svår allergisk reaktion	Betapred tabl 0,5 mg	12 tabletter som löses i vatten	En gång	Ges ej vid allvarig, aktiv infektion
Allvarlig hypoglykemi vid diabetes	Glucagon inj endosspruta	1 ml subcutant intramuskulärt eller intravenöst	Om ej svar inom 10 min upprepas dosen. Vid svar ges perorala kolhydrater	Ges ej vid överkänslighet mot Glucagon
Lungödem	Furix inj 10 mg/ml	4 ml intravenöst, ev intramuskulärt	En gång	Läkare måste omedelbart kontaktas! Ges ej vid överkänslighet mot furosemid.
Tillfällig svår förstoppning	Klyx klyksma 120 ml	120-240 ml rektalt	Två gånger	
Akut nästäppa	Nezeril endospipetter 0,5 mg/ml	1 x 4 i vardera näsborren	Kan upprepas max 7 dygn	
Smärta, feber	Alvedon tabl 500 mg alt. Alvedon supp 1 g	1 - 2 x 1 - 4 per os 1 x 1 - 4 rektalt	Kan upprepas under två dygn	Kombinera ej med andra paracetamolpreparat
Tillfällig förstoppning	Microlax klyksma 5 ml	1 klyksma 5 ml rektalt	Två gånger	



OBS! Det åligger sjuksköterskan att kontrollera kontraindikationer och interaktioner i FASS (www.fass.se) samt varningstext i patientens journal. Rekommenderas från Läke­medelsrådet i Skåne 2020-05-26. Revideras löpande samt årligen. För aktuell version se <http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsforrad/>