



## Förfylld injektionspenna/Inkretiner

- Kan **delegeras** till omvårdnadspersonal som har insulindelegering, delegeringen ska vara personlig och tidsbegränsad.
- **Ordinationen** på Inkretiner finns i Pascal eller på annan aktuell ordinationshandling.
- Skriv på **signeringslistan** ”förfylld injektionspenna Victoza”

## Vad är Inkretiner?

- När vi äter så frisätts ett tarmhormon (GLP-1) från tunntarmen. Detta hormon ökar frisättningen av insulin och hämmar frisättningen av glukagon, på så sätt sänks blodsockret. Tarmhormonet verkar bara en kort stund pga att det bryts ner av ett enzym (DPP-4). Effekten är helt beroende av aktuell blodsockernivå, vid högt blodsocker mer effekt. Ger inte hypoglykemi i monoterapi. **Behandlingen med Inkretiner** innebär att tillföra en substans som aktiverar tarmhormonet eller hämmar nedbrytningen.

## VICTOZA (Liraglutid)

- Injektionsvätska i **förfylld injektionspenna** Flex Pen 6mg/ml. Pennan kan ställas in på doser 0,6mg/1,2mg och 1,8mg.
- Ges en gång dagligen valfri tid oberoende av måltid, rekommenderas samma tid varje dag, subcutant i buk eller lår.
- Den penna som används förvaras i rumstemperatur högst en månad, övriga pennor förvaras i kylskåp.
- Biverkningar: reaktioner på injektionsstället och små knutor kan ses. Illamående och andra besvär från magen, yrsel, huvudvärk mm.
- [Bruksanvisning till Victoza injektionspenna](#)